

Bijlagen

Naar een Zorgstandaard Depressie

Bijlage 1:

Checklist Gebruik van de Multidisciplinaire richtlijn Depressie

Onderdeel A: Diagnostiek

1. Geeft u in onderstaand schema aan bij hoeveel procent van de mensen met depressieve klachten een screening op depressieve klachten heeft plaatsgevonden?

Screening van depressieve klachten	Percentage patiënten waarbij screening van depressieve klachten heeft plaatsgevonden met behulp van...
INSEL (Interventie Studie Eerste Lijn)	
DHS (Depressieherkenningschaal)	
4DKL (Vierdimensionale Klachtenlijst voor het onderscheiden van distress-klachten depressie, angst en somatisatie in de eerste lijn)	
MDQ-NL	
HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale)	
Ander instrument	
Geen van bovengenoemde	
Totaal	100 %

2. Geeft u in onderstaand schema aan bij hoeveel procent van de mensen met depressieve klachten een ernstmeting heeft plaatsgevonden?

Ernstmeting	Percentage patiënten waarbij ernstmeting heeft plaatsgevonden met...
Een van de volgende Interview- en observatieschalen:	
De Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD)	
De Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS)	
de Bech Rafaelsen Melancholia Rating Scale (BRMS)	
Inventory for Depressive Symptomatology (IDS-C)	
Een van de volgende Zelfinvulvragenlijsten:	
De Self-Rating Depression Scale (SDS) van Zung	
De Beck Depression Inventory (BDI)	
De Inventory for Depressive Symptomatology (IDS-SR)	
Anders, namelijk:	

Geen ernstmeting	
Totaal	100%

3. Geeft u in onderstaand schema aan bij hoeveel procent van de mensen met depressieve klachten de diagnose depressie is gesteld met behulp van integrale vastlegging van de assen van de DSM-IV?

De assen van de DSM IV	Percentage patiënten waarbij de DSM-IV-assen zijn vastgelegd op basis van een diagnostisch interview betreffende...
A I Klinische stoornissen	
As II Persoonlijkheidsstoornissen	
As III Somatische aandoeningen	
As IV Psychosociale en omgevingsfactoren	
As V GAF score/CGAS score	
Diagnose vastgesteld op basis van klinisch inzicht	
Totaal	100%

4. Geeft u in onderstaand schema aan bij hoeveel procent van de mensen met depressieve klachten differentiaaldiagnostiek heeft plaatsgevonden?

<i>Differentiaaldiagnostiek</i>	<i>Percentage patiënten waarbij differentiaaldiagnostiek is toegepast</i>
Afgrenzing van andere psychische stoornissen	
Afgrenzing van spanningsklachten, overspanning, burn-out, een aanpassingsstoornis en een rouwreactie	
Check op de oorzakelijke samenhang met het gebruik van genots- of geneesmiddelen	
Geen differentiaal diagnostiek toegepast	
Totaal	100%

5. Geeft u in onderstaand schema aan bij hoeveel procent van de patiënten de ernstmeting om de 6 weken is herhaald?

<i>Herhaling ernstmeting</i>	<i>Percentage patiënten waarbij de ernstmeting om de 6 weken is herhaald</i>
Wel herhaald	
Niet herhaald	
Totaal	100%

Bijlage 1:

Onderdeel B: behandeling

6. Geeft u in onderstaand schema per patiëntengroep het percentage patiënten aan dat de bijbehorende behandel- of begeleidingsvorm(en) heeft gekregen?					
	Type patiënt	Ernst van de depressie	Duur van de depressie	Type behandeling	Percentage patiënten dat het type behandeling in de linkerkolom heeft ontvangen
A	Patiënten met lichte depressieve klachten <i>of</i> een depressie korter dan 3 maanden	Beperkte/subklinische depressie (1 kernsymptoom en in totaal 2-4 symptomen), bijvoorbeeld HRSD-score lager dan 14 <i>of</i> Lichte depressie (5-6 symptomen), bijvoorbeeld HRSD score tussen de 14 en 19	Korter dan 3 maanden	1 ^e stap interventies: Steunende, structurerende interventies	
				+ Monitoring	
				+ Fysieke inspanning	
B	Patiënten met een lichte depressieve stoornis 6 weken na interventie bij A <i>of</i> bij aanmelding langer dan 3 maanden	Lichte (5-6 symptomen) depressie, bijvoorbeeld HRSD-score tussen de 14 en 19	6 weken na interventie bij A <i>of</i> Bij aanmelding langer dan 3 maanden	2 ^e stap interventies: Psychotherapie	
				<i>en/of</i> Antidepressivum	
				+ Monitoring	
				+ Fysieke inspanning	
				+ Psychoeducatie/ Ondersteunende gesprekken t.b.v. adequaat medicijngebruik	
<i>Optioneel:</i> Additionele steunende, structurende interventies					
C	Patiënten met een matige depressieve stoornis <i>of</i> 6 weken na interventie bij A <i>of</i> bij aanmelding langer dan 3 maanden	Matige depressie (6-8 symptomen), bijvoorbeeld HRSD-score tussen de 19 en 24	6 weken na interventie bij A <i>of</i> bij aanmelding langer dan 3 maanden	C1: Zie B	
			4 weken na onvoldoende effect bij C1	C2: Andere psychotherapeutische interventie <i>en/of</i> ander antidepressivum dan bij C1	
D	Patiënten met een ernstige depressieve stoornis bij klinische opname <i>of</i> bij aanmelding langer dan 6 maanden <i>of</i> 4 weken na onvoldoende effect bij C2	Ernstige depressie (8-9 symptomen), bijvoorbeeld HRSD-score meer dan 24	Bij aanmelding langer dan 6 maanden <i>of</i> 4 weken na onvoldoende effect bij C2	Zie B	
				<i>Bij onvoldoende effect van alleen antidepressivum:</i> Andere factoren nagaan	
				+ <i>Keuze uit:</i>	
				Andere psychotherapeutische interventie <i>en/of</i> ander antidepressivum dan bij C2	
				Verhoging van de medicatie	
ECT* + antidepressivum					
				* Alleen 1e keus in levensbedreigende omstandigheden	

E	Patiënten met een lichte, matige of ernstige depressie langer dan 2 jaar	Chronische depressie	Langer dan 2 jaar	Psychotherapie en/of Antidepressivum*	
				+	
				Reïntegratie/rehabilitatie	
				* <i>De keuze van de behandeling is bepaald door:</i> - <i>De voorkeur van de patiënt</i> - <i>Een eerder bij de patiënt succesvol gebleken behandeling</i>	
F	Patiënten met een lichte, matige of ernstige depressie	Na herstel	1 ^e episode	De behandeling wordt 6 maanden gecontinueerd	
			Na recidief	De behandeling wordt 2 jaar of langer gecontinueerd	
G	Klinisch opgenomen patiënten	Na herstel	2 weken na ontslag uit kliniek	Terugvalpreventie	

Bijlage 2

Checklist Kwaliteit van Depressiezorg

1. Bij hoeveel procent van de patiënten is voldaan aan de zorgwensen van de patiënt?

<i>Vervulling zorgwensen</i>	<i>Percentage patiënten waarbij is voldaan aan de zorgwensen</i>
a. De behandeling is de juiste aanpak van de problemen of klachten	
b. Het behandelplan is naar wens uitgevoerd	
Subtotaal (a + b)	
Totaal	100%

2. Bij hoeveel procent van de patiënten is het behandelplan vastgesteld?

<i>Vastgestelde behandelplannen</i>	<i>Percentage patiënten waarbij het behandelplan is vastgesteld</i>
Wel vastgesteld	
Niet vastgesteld	
Totaal	100%

3. Bij hoeveel procent van de patiënten zijn de depressieve klachten verminderd, dan wel verdwenen of gestabiliseerd?

<i>Verandering in ernst van de depressie</i>	<i>Percentage patiënten waarbij...</i>
Klachten zijn verminderd	
Klachten zijn verdwenen	
Klachten zijn gestabiliseerd	
Klachten zijn onveranderd gebleven	
Totaal	100%

4. Bij hoeveel procent van de patiënten die langdurige zorg ontvangen is de kwaliteit van leven verbeterd of gestabiliseerd?

<i>Verandering in ervaren kwaliteit van leven van de patiënt</i>	<i>Percentage patiënten die langdurige zorg ontvangen waarbij...</i>
Kwaliteit van leven is verbeterd	
Kwaliteit van leven is gestabiliseerd	
Geen verandering is opgetreden	
Totaal	100 %

5. Bij hoeveel procent van de patiënten is het sociaal-maatschappelijk functioneren verbeterd of gestabiliseerd?

<i>Verandering in sociaal-maatschappelijk functioneren</i>	<i>Percentage patiënten waarbij...</i>
Sociaal-maatschappelijk functioneren is verbeterd	
Sociaal-maatschappelijk functioneren is gestabiliseerd	
Sociaal-maatschappelijk functioneren onveranderd gebleven	
Totaal	100%

6. Bij hoeveel procent van de patiënten sprake is van een heropname binnen 3 maanden om dezelfde reden of met dezelfde diagnose?

<i>Heropname</i>	<i>Percentage patiënten met een heropname</i>
Wel heropname	
Geen heropname	
Totaal	100%

7. Hoeveel procent van de klinisch opgenomen patiënten heeft een dwangbehandeling gehad?

<i>Dwangbehandelingen</i>	<i>Percentage klinisch opgenomen patiënten met een dwangbehandeling</i>
Wel dwangbehandeling	
Geen dwangbehandeling	
Totaal	100%

8. Hoeveel incidenten zijn er door patiënten gemeld?

Incidenten patiëntenzorg	Aantal meldingen
Agressief gedrag	
Intimidatie	
Ongewenst seksueel gedrag van mede- cliënten of hulpverleners	
Overlast door alcohol of drugsgebruik	
Diefstal	
Overig	
Totaal	100%

9. Gebruik van de multidisciplinaire richtlijn depressie

Zie Checklist Gebruik van de Multidisciplinaire richtlijn Depressie

10. Hoeveel procent van de patiënten kon de behandelaar en/of het type behandeling zelf kiezen?

Keuzevrijheid	Percentage patiënten met een lichte tot matige depressie die de mogelijkheid hebben gehad tot...
Keuze voor behandelaar	
Keuze voor behandeling	
Geen keuze	
Totaal	100%

11. Hoeveel procent van de patiënten heeft de bejegening door de hulpverlener adequaat gevonden?

Adequate bejegening door hulpverleners	Percentage patiënten
Voldoende	
Onvoldoende	
Totaal	100%

12. Hoeveel procent van de patiënten heeft een goede afstemming met ketenpartners ervaren?

Ketenzorg	Percentage patiënten met...
a. Informatieoverdracht met ketenpartners als adequaat ervaren	
b. De behandelafspraken als eenduidig ervaren	
Subtotaal (a + b)	
Totaal	100%

13. Hoeveel procent van de patiënten heeft ingestemd met het behandelplan?

Informed consent	Percentage patiënten dat heeft ingestemd met het behandelplan
Wel ingestemd	
Niet ingestemd	
Totaal	100%

14. Hoeveel procent van de patiënten heeft de behandeling vroegtijdig eenzijdig beëindigd?

Drop-out (vroegtijdige eenzijdige beëindiging van de behandeling)	Percentage patiënten dat de behandeling vroegtijdig eenzijdig heeft beëindigd
Wel	
Niet	
Totaal	100%

15. Bij hoeveel procent van de patiënten is een risicovolle combinatie van medicijnen is geregistreerd?

<i>Complicatieregistratie</i>	<i>Percentage patiënten waarbij een risicovolle combinatie van medicijnen is geregistreerd</i>
Wel	
Niet	
Totaal	100%

16. Hoeveel procent van de hulpverleners heeft diagnostiek en behandeling vastgelegd in het EPD (Elektronisch patiëntendossier)?

<i>Gebruik EPD</i>	<i>Percentage hulpverleners dat diagnostiek en behandeling heeft vastgelegd in het EPD</i>
Wel in EPD	
Niet in EPD	
Totaal	100%

17. Hoeveel procent van de hulpverleners kan altijd en overal gebruikmaken van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)?

<i>24-uurs toegang tot patiënteninformatie</i>	<i>Percentage hulpverleners dat 24-uurs toegang heeft tot patiënteninformatie</i>
Wel 24-uurs toegang	
Geen 24-uurs toegang	
Totaal	100%