

De indicatoren van het verbeterproject depressie

Doelstelling 1: Binnen 6 maanden behandeling is bij 84% van alle nieuwe cliënten de BDI-score lager dan 10 of de GDS-score lager dan 6		Referentiewaarde 43% (Doorbraakproject Depressie 1)*
Indicator 1 a	Binnen drie maanden behandeltime is 60% van de nieuwe cliënten opgeknapt	
Teller	Aantal nieuwe cliënten met een BDI lager dan 10 of een GDS lager dan 6 binnen 3 maanden	
Noemer	Aantal nieuwe cliënten dat minimaal 3 maanden geleden is gestart en minimaal 2 BDI of GDS metingen heeft	
Benodigde gegevens	Begindatum Keuze BDI of GDS meting Datum BDI of GDS meting Score BDI of GDS-meting Minimaal een 2e BDI of GDS meting	
Indicator 1 b	Van de niet opgeknapte cliënten na 3 maanden is binnen 6 maanden behandeltime 60% opgeknapt.	
Teller	Aantal cliënten met een BDI score lager dan 10 of een GDS score lager dan 6, binnen 6 maanden na startdatum	
Noemer	Het aantal nieuwe cliënten dat minimaal 6 maanden geleden is gestart en minimaal 2 BDI of GDS metingen heeft en die na 3 maanden een BDI score groter of gelijk aan 10 of een GDS score groter of gelijk aan 6 heeft.	
Benodigde gegevens	Begindatum Keuze BDI of GDS meting Datum BDI of GDS meting Score BDI of GDS-meting Minimaal een 2e BDI of GDS meting	
Bron *: eindverslag Doorbraakproject depressie 1, Trimbos-instituut, juni 2006		

Doelstelling 2: 80% van de systematische follow-up gesprekken, bij cliënten met een depressie, vindt volgens planning plaats. Tijdens de systematische follow-up vindt een evaluatie van het behandelbeleid plaats en een BDI/GDS meting. Dit gebeurt minimaal in de 6e week na de aanmelding en vervolgens elke 6 weken totdat de BDI lager is dan 10 en de GDS lager dan 6	
Indicator 2a	% BDI of GDS vervolgmetingen per cohort, totdat de BDI lager is dan 10 en de GDS lager dan 6.
Teller	Aantal BDI of GDS vervolgmetingen per cohort, totdat de BDI lager is dan 10 en de GDS lager dan 6. (Dit betekent aantal keer dat wordt voldaan aan de telkens om de 6 weken meten totdat de BDI lager is dan 10 en de GDS lager dan 6)
Noemer	Totaal aantal vervolgmetingen dat gebeurd zou moeten zijn per cohort
Benodigde gegevens	Begindatum Keuze BDI of GDS meting Datum BDI of GDS meting Score BDI of GDS-metingen Einddatum behandeling
Indicator 2b	% BDI of GDS vervolgmetingen per kalenderperiode
Teller	Aantal BDI of GDS vervolgmetingen per kalenderperiode
Noemer	Totaal aantal metingen dat gebeurd zou moeten zijn per kalenderperiode
Benodigde gegevens	Begindatum Keuze BDI of GDS meting Datum BDI of GDS meting Score BDI of GDS-metingen Einddatum behandeling
Indicator 2c	% cliënten waarbij per 3 behandelmaanden minstens 1 x per 6 weken een meting is gedaan
Teller	Aantal cliënten waarbij per 3 behandelmaanden minstens 1 x per 6 weken een meting is gedaan
Noemer	Totaal aantal cliënten waarbij nog een meting nodig is en waarbij minimaal 2 BDI of GDS metingen zijn gedaan
Benodigde gegevens	Begindatum Keuze BDI of GDS meting Datum BDI of GDS meting Score BDI of GDS-metingen Einddatum behandeling

Doelstelling 3: Minder dan 10% van de cliënten met een niet-ernstige depressie ontvangt in de eerste 6 weken een tweede stap interventie	
Indicator 3 a	% cliënten met een niet ernstige depressie dat in de eerste 6 weken een tweede stap interventie heeft ontvangen
Teller	Aantal cliënten met een niet ernstige depressie die een tweede stap interventie ontvangen binnen 6 weken
Noemer	Aantal cliënten met een niet ernstige depressie
Benodigde gegevens	Begindatum De ernst van de depressie Startdatum tweede stap (veelal medicatie)
Indicator 3b	% cliënten met een niet ernstige depressie die in de eerste 6 weken van behandeling een eerste stap interventie heeft ontvangen
Teller	Aantal cliënten met een niet ernstige depressie die een eerste stap interventie ontvangen binnen 6 weken
Noemer	Aantal cliënten met een niet ernstige depressie
Benodigde gegevens	Begindatum De ernst van de depressie Startdatum eerste stap

Doelstelling 4: Bij alle cliënten (100%) met een ernstige depressie is binnen 1 maand na het vaststellen van de diagnose een tweede stap interventie gestart.	
Indicator	% cliënten met een ernstige depressie dat binnen één maand start met een tweede stap behandeling.
Teller	Aantal cliënten dat binnen 1 maand een tweede stap behandeling start.
Noemer	Aantal nieuwe cliënten met een ernstige depressie
Benodigde gegevens	Begindatum De ernst van de depressie Startdatum tweede stap interventie (alle tweede stapsinterventies)

Doelstelling 5: Bij 90% van alle cliënten bij wie gekozen is voor GT, CGT of IPT is de behandeling binnen 1 maand na verwijfsdatum gestart.	
Indicator	% cliënten met een ernstige depressie dat binnen één maand start met GT, CGT of IPT.
Teller	Aantal cliënten dat binnen 1 maand een GT, CGT of IPT start.
Noemer	Aantal nieuwe cliënten bij wie gekozen is voor GT, CGT of IPT
Benodigde gegevens	Begindatum De ernst van de depressie Verwijsdatum voor GT, CGT of IPT Keuze GT, CGT of IPT Startdatum GT, CGT of IPT

Doelstelling 6: Het aantal cliënten met ernstige depressie dat antidepressiva voorgeschreven krijgt en daarmee binnen 3 maanden stopt (vroegtijdige stoppers) is lager dan 20%.	
Indicator	% cliënten met een ernstige depressie dat binnen 3 maanden stopt met antidepressiva
Teller	Aantal cliënten met een ernstige depressie dat antidepressiva gebruikt en daarmee binnen drie maanden gestopt is
Noemer	Aantal cliënten met een ernstige depressie dat een antidepressiva voorgeschreven gekregen heeft
Benodigde gegevens	De ernst van de depressie Begindatum Startdatum medicatie Einddatum medicatie

Doelstelling 7: Bij tenminste 50% van alle cliënten met een depressie is de behandeling in de tweede lijn binnen 6 maanden afgesloten.	
Indicator	% cliënten die behandeling ontvangen in de tweede lijn waarvan die behandeling binnen 6 maanden afgesloten is
Teller	Aantal cliënten dat niet langer dan 6 maanden in de tweede lijn behandeld is
Noemer	Aantal cliënten dat in de tweede lijn aangemeld is.
Benodigde gegevens	Begindatum Aanmeldingsdatum tweede lijn Einddatum tweede lijn (aparte kolom anders dan einddatum behandeling)