

## Indicatoren overzicht verbeterproject Angststoornissen

Mei 2007

<b>Doel</b>	<b>Indicator</b>	
	<b>Teller</b>	<b>Noemer</b>
<p>1 Na 18 weken behandeling in een eerste stap, is bij 70% van alle cliënten de score op de CGI-Improvement* lager dan 3</p> <p>% Cl. na 18 weken 1<sup>e</sup> stap CGI-I &lt; 3</p>	<p>Alle cliënten met een eerste stap behandeling en een behandelduur van 18 weken, en met een CGI-I score lager dan 3 op 18 weken na start behandeling</p>	<p>Alle cliënten met een eerste stap behandeling (startdatum en type behandeling in Excelbestand) en een behandelduur van 18 weken, en met een meting op de CGI-I op 18 weken na start behandeling</p>
<p>2 Na 18 weken behandeling in een eerste stap, is bij 50% van alle cliënten de score op de CGI-Severity* lager dan 3</p> <p>% Cl. na 18 weken 1<sup>e</sup> stap CGI-S &lt; 3</p>	<p>Alle cliënten met een eerste stap behandeling en een behandelduur van 18 weken, en met een CGI-S score lager dan 3 op 18 weken na start behandeling</p>	<p>Alle cliënten met een eerste stap behandeling (startdatum en type behandeling in Excelbestand) en een behandelduur van 18 weken, en met een meting op de CGI-S op 18 weken na start behandeling</p>
<p>3 Na 6 maanden behandeling in een tweede stap, is bij 70% van alle cliënten de score op de CGI-Improvement lager dan 3</p> <p>% Cl. na 6mnd 2<sup>e</sup> stap CGI-I &lt; 3</p>	<p>Alle cliënten met een tweede stap behandeling en een behandelduur van 6 maanden, en met een CGI-I score lager dan 3 op 6 maanden na start behandeling</p>	<p>Alle cliënten met een tweede stap behandeling (startdatum en type behandeling in Excelbestand) en een behandelduur van 6 maanden, en met een meting op de CGI-I op 6 maanden na start behandeling</p>
<p>4 Na 6 maanden behandeling in een tweede stap, is bij 50% van alle cliënten de score op de CGI-Severity lager dan 3</p> <p>% Cl. na 6mnd 2<sup>e</sup> stap CGI-S &lt; 3</p>	<p>Alle cliënten met een tweede stap behandeling en een behandelduur van 6 maanden, en met een CGI-S score lager dan 3 op 6 maanden na start behandeling</p>	<p>Alle cliënten met een tweede stap behandeling (startdatum en type behandeling in Excelbestand) en een behandelduur van 6 maanden, en met een meting op de CGI-S op 6 maanden na start behandeling</p>

<b><i>Herkenning en diagnostiek</i></b>	<b><i>Teller</i></b>	<b><i>Noemer</i></b>
<p>1A Elke maand neemt de huisarts bij minimaal 4 per 1000 ingeschreven cliënten, bij wie een vermoeden* op een angststoornis bestaat, de 4DKL* af</p> <p>Aantal cl. met 4DKL meting per 1000 cl. per maand</p>	Aantal cliënten van huisartsenpraktijk X bij wie in maand Y een 4DKL is afgenomen (datum afname in Excelbestand)	Aantal bij huisartsenpraktijk X ingeschreven cliënten
<p>1B Bij 80% van de cliënten die op de angstdimensie van de 4DKL een score hebben tussen 4 en 8 doet de huisarts opnieuw een beoordeling van de angstklachten met de 4DKL binnen 6 weken</p> <p>% Cl. met een 2<sup>e</sup> meting binnen 6 weken na 4DKL score tussen 4 en 8</p>	Aantal cliënten met een 4DKL meting, die een score 4 t/m 8 hebben op de angstdimensie, en bij wie binnen 6 weken na de eerste 4DKL meting een tweede 4DKL meting is uitgevoerd (datum afname in Excelbestand)	Aantal huisartscliënten met een 4DKL meting (datum afname in Excelbestand), die een score 4 t/m 8 hebben op de angstdimensie
<p>2 Bij 80% van de cliënten die op de angstdimensie van de 4DKL een score hoger hebben dan 8 stelt de huisarts binnen 2 weken een specifieke* diagnose volgens de DSM-IV</p> <p>% Cl. met DSM-IV diagnose binnen 2 weken na 4DKL score &gt; 8</p>	Aantal cliënten met een 4DKL meting, die een score 9 of hoger hebben op de angstdimensie, en die binnen 2 weken na de 4DKL meting een DSM-IV diagnose hebben gekregen (DSM-code en datum diagnose in Excelbestand)	Aantal huisartscliënten met een 4DKL meting (datum afname in Excelbestand), die een score 9 of hoger hebben op de angstdimensie
<p>3 Bij 90% van de cliënten die aangemeld worden bij de GGZ/1<sup>e</sup> lijnpsycholoog, wordt bij de intake een semigestructureerd interview afgenomen conform de richtlijn</p> <p>% Cl. GGZ/ELP met semigestructureerd interview</p>	Aantal cliënten met een intake bij een GGZ/1 <sup>e</sup> lijnpsycholoog bij wie een semigestructureerd interview is afgenomen (aangetekend in Excelbestand)	Aantal cliënten met een intake bij een GGZ/1 <sup>e</sup> lijnpsycholoog (datum intakegesprek in Excelbestand)
<b><i>Verstrekken van informatie</i></b>		
<p>1 Bij 90% van de cliënten bij wie de diagnose angststoornis vastgesteld is vindt binnen 2 weken psychoeducatie* plaats</p> <p>% Cl. binnen 2 weken na diagnose met psychoeducatie</p>	Aantal cliënten met een DSM-IV diagnose angststoornis (code xxx), die binnen 2 weken na diagnosestelling psychoeducatie volgens de richtlijn hebben ontvangen (datum in Excelbestand)	Aantal cliënten met een DSM-IV diagnose angststoornis (DSM code xxx in Excelbestand)

	<b>Teller</b>	<b>Noemer</b>
<b>Stepped Care</b>		
1 Bij 80% van de cliënten die geen complexe angststoornis* heeft, is een eerste stap interventie gestart  % Cl. niet complex met eerste stap	Aantal cliënten zonder complexe angststoornis, bij wie een eerste stap interventie is gestart (startdatum en type interventie in Excelbestand)	Aantal cliënten zonder complexe angststoornis (DSM code xxx in Excelbestand)
2 Bij 80% van de cliënten met een eerste stap behandeling van wie de angstklachten na 18 weken nog niet in remissie (CGI-S 3 of hoger) zijn, wordt een interventie uit de tweede stap gestart  % Cl. niet in remissie 2 <sup>e</sup> stap gestart	Aantal cliënten zonder complexe angststoornis, met een eerste stap interventie, met een CGI-S score 3 of hoger op 18 weken na start behandeling, én met een start van een tweede stap interventie (startdatum en type tweede stap interventie in Excelbestand)	Aantal cliënten zonder complexe angststoornis (DSM code xxx in Excelbestand) en met een eerste stap interventie (startdatum en type eerste stap interventie in Excelbestand)
3 60% van alle cliënten die een tweede stap interventie start, krijgt een volgens een psychotherapeutische behandeling volgens de multidisciplinaire richtlijn  % Cl. met (C)GT als 2 <sup>e</sup> stap	Aantal cliënten met een tweede stap interventie én met een psychotherapeutische behandeling (startdatum en type behandeling in Excelbestand)	Aantal cliënten met een tweede stap interventie (startdatum en type tweede stap interventie in Excelbestand)
4A Bij 75% van de cliënten bij wie een eerste antidepressivum na 6 weken (paniekstoornis, GAS, OCS) c.q. 12 weken (PTSS, sociale fobie) resulteert in onvoldoende verbetering, wordt de dosering van het antidepressivum verhoogd conform de richtlijn  % Cl. met verhoging antidepressiva bij geen respons	Aantal cliënten met een paniekstoornis, GAS of OCS (DSM code in Excelbestand), met een eerste antidepressivum, met een CGIC score 3 of hoger op 6 weken na start antidepressivum, én met een verhoging van de dosering antidepressivum (datum verhoging in Excelbestand)	Aantal cliënten met een paniekstoornis, GAS of OCS (DSM code in Excelbestand) én met een eerste antidepressivum (startdatum antidepressivum in Excelbestand) én met een CGIC score 3 of hoger op 6 weken na start antidepressivum
	Aantal cliënten met PTSS of sociale fobie (DSM code in Excelbestand) én met een eerste antidepressivum én met een CGIC score 3 of hoger op 12 weken na start antidepressivum, én met een verhoging van de dosering antidepressivum (datum verhoging	Aantal cliënten met PTSS of sociale fobie (DSM code in Excelbestand) én met een eerste antidepressivum (startdatum antidepressivum in Excelbestand) én met een CGIC score 3 of hoger op 12 weken na start antidepressivum

	in Excelbestand)	
	<b>Teller</b>	<b>Noemer</b>
<p>4B Bij 80% van de cliënten (in 2<sup>e</sup> stap) waarbij het eerste antidepressivum ondanks verhoging van de dosering na een periode van 12 weken (paniekstoornis, GAS, OCS) c.q. 18 weken (PTSS, sociale fobie) resulteert in onvoldoende verbetering, wordt een nieuwe 2e stap interventie ingezet</p> <p>% Cl. met nieuwe 2<sup>e</sup> stap bij geen respons</p>	<p>Aantal cliënten met een paniekstoornis, GAS of OCS (DSM code in Excelbestand), met een tweede stap behandeling, met een verhoging van de dosering antidepressivum op 6 weken na startdatum antidepressivum, met een CGIC score 3 of hoger op 12 weken na start antidepressivum, én met een nieuwe tweede stap behandeling (startdatum en type nieuwe tweede stap behandeling in Excelbestand)</p>	<p>Aantal cliënten met een paniekstoornis, GAS of OCS (DSM code in Excelbestand), met een tweede stap behandeling (startdatum tweede stap in Excelbestand), met een verhoging van de dosering antidepressivum op 6 weken na startdatum antidepressivum, én met een CGIC score 3 of hoger op 12 weken na start antidepressivum</p>
	<p>Aantal cliënten met een PTSS of sociale fobie (DSM code in Excelbestand), met een tweede stap behandeling, met een verhoging van de dosering antidepressivum op 12 weken na startdatum antidepressivum, met een CGIC score 3 of hoger op 18 weken na start antidepressivum, én met een nieuwe tweede stap behandeling (startdatum en type nieuwe tweede stap behandeling in Excelbestand)</p>	<p>Aantal cliënten met een PTSS of sociale fobie (DSM code in Excelbestand), met een tweede stap behandeling (startdatum tweede stap in Excelbestand), met een verhoging van de dosering antidepressivum op 12 weken na startdatum antidepressivum, én met een CGIC score 3 of hoger op 18 weken na start antidepressivum</p>
<p>4C Tenminste 90% van de cliënten gebruiken 12 weken na het stellen van de diagnose helemaal geen benzodiazepines (meer)</p> <p>% Cl. zonder Benzodiazepines na 12 weken</p>	<p>Aantal cliënten met een DSM-IV diagnose, en géén (voorgeschreven) gebruik van benzodiazepines op 12 weken na diagnosedatum (start- en stopdatum benzodiazepines in Excelbestand)</p>	<p>Aantal cliënten met een DSM-IV diagnose (DSM-code en datum diagnose in Excelbestand)</p>

<b>Monitoren</b>		
<p>1 Bij 80% van alle cliënten vindt eenmaal in de zes weken een systematische follow-up* plaats, totdat de score op de CGI-Severity twee keer achter elkaar lager dan 3 is</p> <p>% Cl. met een CGI-S meting per 6 weken per cohort</p>	<p>Aantal cliënten in behandeling, met een CGI-meting op 6 weken na start behandeling, én niet voldoen aan het criterium van twee keer achtereen een score lager dan 3 op de CGI-S</p>	<p>Totaal aantal cliënten dat 6 weken in behandeling is</p>
	<p>Aantal cliënten in behandeling, met een CGI-meting op 12 weken na start behandeling, én niet voldoen aan het criterium van twee keer achtereen een score lager dan 3 op de CGI-S</p>	<p>Totaal aantal cliënten dat 12 weken in behandeling is</p>
	<p>Aantal cliënten in behandeling, met een CGI-meting op XX weken na start behandeling, én niet voldoen aan het criterium van twee keer achtereen een score lager dan 3 op de CGI-S</p>	<p>Totaal aantal cliënten dat XX weken in behandeling is</p>
<b>Wachttijl verkorting</b>		
<p>1 Bij 80% van de cliënten die door de huisarts verwezen worden naar de GGZ is binnen 3 weken een behandelplan* opgesteld</p> <p>% Cl. GGZ/ELP met behandelplan binnen 3 weken</p>	<p>Aantal cliënten dat door de huisarts is verwezen naar de GGZ, met een behandelplan binnen 3 weken na aanmelding 2<sup>e</sup> lijn (datum behandelplan in Excelbestand)</p>	<p>Aantal cliënten dat door de huisarts is verwezen naar de GGZ (genoteerd in Excelbestand: aanmelding 2<sup>e</sup> lijn)</p>
<p>2 Bij 80% van alle cliënten in behandeling bij GGZ of eerstelijns psycholoog is binnen 3 weken na diagnosestelling een behandeling conform de multidisciplinaire richtlijn gestart</p> <p>% Cl. GGZ/ELP start behandeling &lt;=3 weken na plandatum</p>	<p>Aantal cliënten in behandeling bij GGZ of 1<sup>e</sup> lijnspsycholoog, met een diagnose angststoornis, én een start behandeling volgens protocol binnen 3 weken na diagnosestelling (startdatum behandeling in Excelbestand)</p>	<p>Aantal cliënten in behandeling bij GGZ of 1<sup>e</sup> lijnspsycholoog met een DSM-IV diagnose (datum diagnose in Excelbestand)</p>

<b>Therapietrouw</b>		
<p>1 Het aantal cliënten met complexe angst dat antidepressiva voorgeschreven krijgt en daarmee binnen 3 maanden stopt is lager dan 25%</p> <p>% Cl. complex dat binnen 3 mnd stopt met AD</p>	<p>Aantal cliënten met complexe angst dat antidepressiva krijgt voorgeschreven, én een stopdatum binnen 3 maanden na startdatum (stopdatum antidepressivum in Excelbestand)</p>	<p>Aantal cliënten met complexe angst (DSM code xxx in Excelbestand) dat antidepressiva krijgt voorgeschreven (startdatum antidepressivum)</p>