

Voltooid Tegenwoordige Tijd

**Suicide bij ouderen: medisch onderbehandeld,
maatschappelijk onderbelicht**

Eric van Exel
16-11-2023

Omie Roos




Ziva, Karst en Omie Roos

Stellingen

- Psychiatrische problemen bij ouderen komen voort uit een gebrek aan maatschappelijke betekenis
- Zelfdoding bij ouderen is een onderschat probleem
- Toegang tot zorg voor ouderen moet anders worden geregeld

Psychiatrische problemen bij ouderen komen voort uit een gebrek aan maatschappelijke betekenis (stelling1)




Veerkracht



Almar Kok
LASA/NESDO

Voltooid leven, euthanasie en de maatschappij

- 1) Eenzaamheid
- 2) Er niet meer toe te doen
- 3) Niet goed uiten
- 4) Geestelijk en lichamelijk vermoeid
- 5) Bang afhankelijk te worden van anderen




Sisco
van Veen

Zelfdoding bij ouderen is een onderschat probleem

(stelling 2)

Suicide rates by age, World, 2019


The suicide rate is the number of deaths by suicide per 100,000 individuals in a given demographic.



Source: IHME, Global Burden of Disease

OurWorldInData.org/suicide • CC BY

Zelfdoding bij ouderen




Verklaring zelfdoding bij ouderen


Individueel/medisch vs maatschappelijk probleem

- 1) Geestelijk en lichamelijk vermoeid (medisch probleem)
- 2) Eenzaamheid
- 3) Er niet meer toe te doen
- 4) Niet goed uiten
- 5) Bang afhankelijk te worden van anderen

Wat kunnen we nu doen: versterken 1^e lijn



Voordeel bewegen




Ilse van
Beljouw





Harm van
Marwijk

Wat gaan we doen



Elektroconvulsietherapie (ECT)



Lianneke Egberink



Annemiek Dols



Mardien Oudega



Didi Rhebergen



Siegfried Schouws

Preventie van recidief depressie



Tanja
Su




Amanda
Legemaat



Claudi
Bockting

Ketamine vs ECT




Robert
Schoevers


Martijn
Godschalk

Rosalie
Fleurbaaij

repetitieve Trans Craniele Magnetische Stimulatie rTMS



Neurochemisch



Electrochemisch

rTMS in bipolaire depressie


- RCT



Eva Oostra


rTMS in unipolaire depressie

Neuronavigated iTBS (5 dagen)/ Stanford protocol




Remissie 75%

Patienten geïndiceerd voor rTMS + 2 gefaalde evidence based behandelingen



standaard rTMS (6 weken)




Remissie 25%



Coen
Coomen

Tom
Biemans

Neuropsychiatrie




Welmoed
Krudop



Jolande
Pijneburg



Mardien
Oudega



GHB, GABA en katatonie

**GABA and Glutamate
Balance is Important**



Lilian
Bot




Josine
van Mill



Laetitia
Smarius

Toegang tot zorg voor ouderen moet anders worden geregeld (stelling 3)



**Toename aantal 80 + in
2050 t.o.v. 2021 2-3x**

**2021 12 werkenden, voor
een 80+
2050 4-7 werkenden voor
een 80+**

Toegang tot zorg voor ouderen

- 1) Zorg naar 1^e lijn
- 2) Politieke betrokkenheid
- 3) Maatschappelijke veranderingen (anti-agism)

Toegang tot zorg voor ouderen

- 1) Zorg naar 1^e lijn
Amsterdam UMC, GGZinGeest, Arkin, GGZ Centraal, OLVG



Martin
Smalbrugge

Hein
van Hout

Claudia
de Koning



Vivan
Lauffer

Jeroen
van Zanten


Lianneke
Egberink

Toegang tot zorg voor ouderen

2) Politieke betrokkenheid



Wat gaan we doen?



IF YOU CHANGE
NOTHING, NOTHING
WILL CHANGE.

Stellingen

- Psychiatrische problemen bij ouderen komen voort uit een gebrek aan maatschappelijke betekenis
- Zelfdoding bij ouderen is een onderschat probleem
- Toegang tot zorg voor ouderen moet anders worden geregeld